HERBST 2021

ERNÄHRUNGS-RUNDBRIEF

IN DER AKTUELLEN AUSGABE DES ALMOND BOARD ERNÄHRUNGSRUNDBRIEFS:

Willkommen zum neuen Ernährungsrundbrief– die lange Sommerpause ist vorbei und es ist wieder an der Zeit neue Wissen rund um das Thema Mandeln auszutauschen! Unser aktueller Ernährungsrundbrief bietet neue Forschungsergebnisse über Prädiabetes und jüngst Erkenntnisse zum klassischen Thema Mandelmilch. Außerdem bieten wir Ihnen Informationen zu unserer Academy zur Verfügung sowie einen Überblick zu neuen Forschungsprojekten in Bezug auf die Mandel und ein aktuelles Haiku zur über nachhaltige Erfindung. Genießen Sie außerdem ein wärmendes Frühstücksrezept, das perfekt ist, um Sie auf kühle Morgen vorzubereiten!

BLICKPUNKT: DIABETES:

Am 14. November ist Weltdiabetestag und leider gehen die Zahlen in die falsche Richtung. Basierend auf Daten jüngster Studien berichtet die Internationale Diabetes Federation aus dem Jahr 2019 leiden weltweit mehr als 463 Millionen Erwachsene mit Diabetes, und bis 2045 wird diese Zahl voraussichtlich auf 700 Millionen anwachsen¹. Als Gesundheitsexperten sind wir bestrebt in der Lage Ernährungsstrategien zur Behandlung von Diabetes auszutauschen und darüber zu informieren, wie man das Fortschreiten von Prädiabetes zu Diabetes mindern kann. Mandeln liefern Ballaststoffe (12,5 / 4 g pro 100 g / 30 g Portion) und 15 essentielle Nährstoffe, darunter gute Fette (11 g Portion), Magnesium (270 / 81 mg), Kalium (733 / 220 mg) und Vitamin E (25,6 / 7,7) mg, was sie zu einem perfekten nährstoffreichen Snack für Menschen mit eingeschränkter Glukosetoleranz oder Typ-2-Diabetes macht.

STUDIE AUF EINEN BLICK:

Eine neue indische Studie² zeigte, dass Mandeln die Snack-Wahl bei Prädiabetes waren, bei der Glukosestoffwechsel bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Prädiabetes verbessert wurde. Es ist die erste Studie mit Mandeln, in der Jugendliche (junge Erwachsene mit Prädiabetes untersucht wurden. Forscher der University of California-Irvine³ Die Verbesserung des Blutzuckerwerte in Prädiabetes Studien kann dazu beitragen, die Entwicklung von Typ-2-Diabetes zu verhindern. Zu diesen Studien gehören Messungen des Nüchternblutzuckerspiegels und des „Nüchtern" LDL-Cholesterin im Vergleich zu Kontrollgruppe signifikant, während der „gute" HDL-Cholesterinspiegel auf aufrechterhalten wurde.

Die Mandelgruppe (n = 107) all drei Monate lang täglich 56 Gramm (~340 Kalorien) ungesalzene, rohe Mandeln konsumierte, während (n = 112) einen nährstoffarmen Snack mit der gleichen Kalorienzahl. Der Verzehr von Mandeln als Snack wurde in der Mandelgruppe getestet, während die Kontrollgruppe als die Norm verhalten Snack zu sich nahm. Die Studie untersuchte vor dieser Altersgruppe häufig konsumiert wird. Sowohl die Mandeln als auch die herhalten Snacks machten ~20% der Gesamtenergieaufnahme der Teilnehmenden aus.

Während der gesamten Dauer der Untersuchung wurden die Teilnehmer*innen intensiv begleitet, um ihre Compliance sicherzustellen und die Snacks korrekt zu konsumieren. Am Ende der Studie wurde erneut die Nahrungsaufnahme der Teilnehmenden erhoben und die gleichen Messungen und Blutteste wie zu Beginn wurden durchgeführt.

In der Mandelgruppe nahm der HbA1c-Wert im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant ab. Die Verbesserung der Blutzuckerwerte in Prädiabetes Studien kann dazu beitragen, die Entwicklung von Typ-2-Diabetes zu verhindern. Zu diesen Studien gehören Messungen des Nüchternblutzuckerspiegels und des „nüchtern" LDL-Cholesterin im Vergleich zu Kontrollgruppe signifikant, während der „gute" HDL-Cholesterinspiegel auf aufrechterhalten wurde.

Zweifellos bin beiden Gruppen gab es zu Beginn der Studie keine signifikanten Unterschiede weder bei Gewicht, Größe, Taillen- oder Hüftumfang noch bei den biochemischen Markern. Am Ende des Beobachtungszeitraums hatten die Entzündungsmarker (TNF-α und IL-6) in der Mandelgruppe abgenommen und in der Kontrollgruppe zu- oder abgenommen, was statistisch signifikantes Ergebnis. Der Nüchternblutzuckerspiegel war in der Kontrollgruppe im Vergleich zur Mandelgruppe nach der Intervention signifikant reduziert. In der Mandelgruppe wurde eine FSIVI-Verbesserung (Beta-Zellen-Funktion) beobachtet. Nüchternwerte wie, allgemeine Verbesserung, jedoch statistisch nicht signifikant.

Zu den Einschränkungen der Studie gehört, dass sie nicht als Blindstudie durchgeführt werden konnte. Darüber hinaus wurden Ernährungsinterviewstudien auf sich Verhaltensänderungen in beiden Gruppen zudem, als die Teilnehmer*innen während des Rekrutierungsprozesses für ihre Rieken sensibilisiert werden. Weitere Forschung ist erforderlich, um die Auswirkungen des Mandelkonsums auf die gleichen Messgrößen in anderen Altersgruppen und unterschiedlichen Ethnien zu untersuchen.

STUDIENFAZIT:

Es wurde gezeigt, dass Mandeln einen Einfluss auf den Glukosestoffwechsel haben. Sie werden den Hüft-Nüsse Spiegel bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit erhöhtem Diabetes-Risiko in Indien in nur 12 Wochen. Mandeln als Snack unterstützten auch bei der Behandlung von Dyslipidämie, indem sie das Gesamtcholesterin und das „schlechte" LDL-Cholesterin senken, während sie gleichzeitig den „guten" HDL-Cholesterinspiegel auf aufrechterhalten. Diese Ergebnisse sind ermutigend, da sie zeigen, dass Mandeln als Snack-Alternative eine wirksame Strategie sein kann, um die Entwicklung von Typ-2-Diabetes zu verhindern oder zu verzögern. Insbesondere bei der jüngeren Bevölkerung. Lesen Sie hier die vollständige Studie.

Diese Untersuchung schließt sich einer anderen vom Almond Board of California finanzierten Studie⁴ an, in der gezeigt wurde, dass Mandeln als Snack bei übergewichtigen Erwachsenen mit Prädiabetes zu einer Verbesserung der Glukosekontrolle führen, gemessen anhand des Glukose-Stoffwechsel. Wahl sein kann. Unter Studienanfänger*innen, die überwiegend auf ein Frühstück verzichten (70 Männer und Frauen, 18 bis 30 Jahre alt), reduzierte der Verzehr von Mandeln als Snacks - entweder Mandeln oder Graham Cracker - das Gesamtcholesterin und das „schlechte" LDL-Cholesterin signifikant, wobei die Vorteile bei Mandeln größer waren. Diesingen, die Mandeln snackten, konnten während der 8-wöchigen Studie den „guten" HDL-Cholesterinspiegel besser aufrechterhalten und die Marker für die Blutzuckerregulation verbessern. Lesen Sie hier die vollständige Studie.

1 - IDF Diabetes Atlas, 9. Ausgabe. 2019. https://www.diabetesatlas.org/en. Zugriff am 14. Juli 2021.

2 - Mandar J, Desai S, Mishra P, Sajeev S, Bahirwani R, Mehta A, Kamble P, Kalita S, Phatak AG, Udipi SA, Yadrav RA and Ghugre PS (2021) Daily Consumption of Almonds as a Mid-Morning Snack Improves Glycemic Response and Markers of Inflammation: A Randomized Controlled Trial in Adolescents and Young Adults. Front. Nutrients. 8:630822. doi: 10.3389/fnut.2021.630822

3 - Dhillon J, Thorwald M, de la Cruz N, Li C, Avglar SA, Kuwa D, Ross UO, Orlo RM. Glycemiogenic and cardiometabolic profiles of almond vs. cracker snacking for 8 weeks in young adults: A randomized controlled trial. Nutrients 2018; 10(8): 992. https://doi.org/10.3390/nu10080992.

FORSCHUNGS-UPDATE:

Dreher ML. A Comprehensive Review of Almond Clinical Trials on Weight Measures, Metabolic Health Biomarkers and Outcomes, and the Gut Microbiota. Nutrients. 2021; 13(8):2768. https://doi.org/10.3390/nu13082768.

Diese neue umfassende Übersichtsarbeit⁴ fasst 64 randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) und 14 systematische Übersichtsarbeiten zusammen, die Auswirkungen des Verzehrs von Mandeln auf Gewichtsmanagement und Stoffwechselgesundheit, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungsrisiken und Biomarkern des Darmgesundheit zu bestimmen. Für neu hinzugekommene Forschungsberichte hält der Wissenschaftler fest, dass Mandeln Teil einer gesunden, ausgewogenen Ernährung sind, die zu Gewichtsverlust führen können, wie z.B. verbesserte kognitive Leistung und reduzierte Alterung der Gesichtshaut, wenn diese LVB-Strahlung ausgesetzt ist.

Die diese Übersichtsarbeit (peer-reviewed) untersucht, ist wurde sie vom Autor in drei Kategorien unterteilt: Gewicht, Stoffwechsel Ergebnisse aus jedem Abschnitt sind hier aufgeführt, sie denen als Wegweiser für die übergroßen Forschungsberichte.

Der erste Abschnitt konzentriert sich auf die Wirkung von Mandeln auf Messgrößen mit Bezug auf das Gewicht, einschließlich Gewichtsverlust, Körpergewicht, Mandeln, Nüsse, Körperumfang, Gewichtsverlust, Gewichtsmanagement, Körperzusammensetzung, Energieeffizienz, Sättigkeit, Körperfett, Stammfettsucht, viszerales Fett, Taillenumfang (WC), Appetit, Hunger, Sättigung, Sattheit, metabolisierbare Energie (ME), Energiedichte (ED), das sich beim Verzehr wie Lebensmittel mit geringerer ED verhält, wie durch Studien zur tatsächlichen Bioverfügbarkeit der enthaltenen Kalorien.

- Jüngste systematische Übersichtsarbeiten und Metaanalysen von randomisierten, kontrollierten Studien (RCTs) haben gezeigt, dass Mandeln die einzige Nuss waren, die im Vergleich zu Kontrolldiäten eine kleine, aber signifikante Abnahme sowohl der mittleren Körpermasse als auch des Fettmasse aufwiesen.
- Die folgenden Mechanismen wurden zwischen Mandeln und Gewichtskontrolle als Zusammenhänge identifiziert: Mandeln können aufgrund ihrer Zusammensetzung verbesserte Kalorienabsorption für eine niedrigere metabolisierbare Nettoenergie (ME), Hochregulation der Gene zur Verringerung des Hungers, erhöhtes Sättigungsgefühl sowie erhöhter Energieumsatz in Ruhe.

Als nächstes konzentriert sich das Review auf die Wirkung von Mandeln auf die Biomarker metabolischer Gesundheit und die zugehörigen Ergebnisse, die folgenden: Mandeln wurden erbsenger; chronische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD), Typ-2-Diabetes, metabolisches Syndrom, Blutdruck, Nüchternblutzucker, Insulinresistenz, Insulinsekretion und entzündlicher Stress, Blutdruck (BP), Gefäßfunktion, Hypertonie, Arteriosklerose, Nüchternblutzucker, Insulinsekretion und Insulinresistenz, Nüchternblutzucker, Insulinsekretion und Insulinresistenz, Nüchternblutzucker, Insulinsekretion und Insulinresistenz